

У Степу, південному та центральному Лісостепу **клоп шкідлива черепашка** за чисельності 0,2-2, осередково 3 екз. на кв.м (Запорізька обл.) заселив 20-70% площ **озимих**, 2-10% площ **ярих зернових** культур, де пошкодив 1-5, макс. 10% рослин озимої пшениці. Продовжується відкладання яєць клопами (0,1-1 екз. на кв.м), в південних областях Степу відмічено відродження личинок фітофага. У Поліссі та північних областях Лісостепу посіви заселяють переважно **австрійський, маврський, гостроголовий**, інші види **клопів**.

Захист посівів пшениці від личинок клопа шкідливої черепашки доцільний за наявності 15-30% личинок третього віку та чисельності 2-х і більше їх на кв.м дозволеними до використання пестицидами, які будуть ефективними проти супутніх шкідників.

Повсюди розвиваються **злакові попелиці, мухи, цикадки, хлібні п'явиці**, які в допороговій чисельності заселили та пошкодили від 2 до 15% рослин озимих та ярих культур. В Степу відмічається масовий розвиток **пшеничного трипса**, яким на 60-100% обстежених площ заселено 5-12, макс. 35 (Миколаївська обл.), осередково до 50% рослин (Запорізька обл.) озимих пшениці і ячменю, за чисельності 2-8 екз. на рослину.

В південних областях на посівах озимої пшениці відмічається шкодочинність **злакової листовійки**. Шкідник зосереджений переважно у крайових смугах посівів, де за чисельності 0,5-2 екз. на кв.м у Запорізькій, Херсонській та 15-40 екз. на кв.м Миколаївській областях пошкодили від 3 до 6% рослин. В подальшому підвищення температурного режиму сприятиме більш активному розвитку, розселенню й шкідливості вищезазначених шкідників.

У західних, подекуди південних та центральних областях за випадання опадів, утворення густих туманів та рясних рос у посівах **озимих і ярих зернових** культур відмічено наростання розвитку **борошнистої роси, септоріозу, бурої листової іржі, гелмінтоспоріозу, сітчастої, смугастої та темно-бурої плямистостей**, якими охоплено 2-22, макс. 30-40% рослин (Запорізька, Миколаївська обл.) на 14-75% обстежених площ. Осередково у загущених посівах (175 га) Київської області **борошнистою росою** охоплено до 60% рослин озимої пшениці в слабкому ступені. У Чернігівській області в посівах **вівса червоно-бурою плямистістю** уражено до 3% рослин. У Запорізькій, Кіровоградській, Херсонській та Черкаській областях **піренофорозом та ринхоспоріозом** охоплено 2-6, макс. 15% рослини озимих культур. **Кореневими гнилями** уражено 2-11% рослин озимих та 1-3% ярих культур. В Кіровоградській області на 5% рослин відмічено розвиток **жовтої іржі**.

Для оздоровлення рослин озимої пшениці в кінці фази виходу в трубку (поява прапорцевого листка) – початок формування зернівки повсюди проти вищевказаних хвороб посіви обприскують дозволеними до використання фунгіцидами. Високопродуктивні посіви доцільно оздоровлювати за наявності хвороб (1%

інтенсивності ураження рослин плямистостями, 3-5% септоріозу листя та піренофорозу) та сприятливих для розвитку хвороб погодних умов і тривалих рос.

Скрізь у посівах *кукурудзи* розвиваються **злакові блішки, шведські мухи, попелиці, піщаний мідляк та ґрунтові шкідники**, які пошкодили 2-9% рослин. Осередково відмічено розвиток **кореневих гнилей**.

У посівах *гороху* триває заселення, розвиток та шкідливість **бульбочкових довгоносиків, горохового зерноїда, попелиць**, осередково рослини пошкоджує **піщаний мідляк**. Із хвороб виявляють **кореневі гнилі, аскохітоз, іржу**. Сходи *сої* пошкоджують жуки **піщаного мідяка та бульбочкові довгоносики**. Повсюди в *багаторічних травах* рослинами живляться **бульбочковий, великий люцерновий, конюшиновий, інші довгоносики, клопи сліпняки, попелиці**, із хвороб – **бура плямистість**.

Рослинам *соняшнику* завдають шкоди **сірий буряковий та південний довгоносики** (переважно заселені прикрайові смуги), які за чисельності 0,1-1 екз. на кв.м пошкодили 1-5, макс. 18% рослин (Київська обл.) у слабкому ступені. **Піщаним мідляком** на 8-30% обстежених площ, за чисельності 0,1-1, макс. 3 екз. на кв.м пошкоджено 2-12% рослин у слабкому ступені. Осередково в господарствах Запорізької області спостерігалася підвищена шкодочинність гусениць **підгризаючих совок**, які за чисельності 1,5-3 гусениць на кв.м пошкодили до 12% рослин на 7% обстежених площ. В Закарпатській області відмічено заселення рослин соняшника **попелицями**. У Миколаївській області на падалиці соняшника відмічено прояв **переноспорозу**.

У посівах *цукрових буряків* буряковими довгоносиками (звичайний та **сірий буряковий**) за чисельності 0,1-0,5 екз. на кв.м пошкоджено 0,5-8%, рослин у слабкому та середньому ступенях (Вінницька, Волинська, Київська, Полтавська, Хмельницька, Тернопільська обл.). На 2-6% рослин харчуються **бурякові блішки, щитоноски**, осередково **крихітка, піщаний мідляк**. Триває літ бурякової **мінуючої мухи** та відкладання нею яєць. У господарствах Вінницької та Київської областей **коренеїдом** уражено від 1 до 8% рослин, поширення якого в посівах обмежують через міжрядні рихлення.

Цукрові буряки у фазі II-III пар справжніх листків за чисельності довгоносиків: звичайного 0,2-0,3, сірого 0,2-0,5, чорного 0,3, блішок 3-7, щитоносок 0,7-1,2 екз. на кв.м; крихітки – 1,5-2,5 екз. в куб. дм ґрунту, за заселеності рослин попелицею до 10%, мухи - 30% заселених рослин і 3-5 личинок на рослину обробляють дозволеними до використання інсектицидами.

Посівам *озимого ріпаку* (масове цвітіння, утворення стручків) продовжують завдавати шкоди **ріпаковий квіткоїд, насіннєвий прихованохоботник**, які заселили 16-75, макс. 100% обстежених площ та пошкодили 5-15, осередково 20% рослин та 5-17% квіток на необроблених посівах (Миколаївська, Черкаська, Чернівецька обл.). Подекуди в посівах шкодять **оленка волохата, капустяна попелиця, хрестоцвіті клопи**. Триває літ **капустяних білана, молі**.

Помірно тепла і достатня волога погода сприяла розвитку збудників **переноспорозу, альтернаріозу, фомозу**, якими уражено 2-12% рослин, осередково в Житомирській області до 5% рослин охоплено **борошнистою росю**. Надалі уражене листя відмиратиме, а патогени інфікуватимуть стебла і

стручки ріпаку, викликаючи його передчасне дозрівання, формування недорозвиненого насіння і розтріскування стручків.

На **ярому ріпаку** шкодять **хрестоцвіті блішки**, чисельність яких контролюють через обробки дозволеними до використання препаратами. В господарствах Чернігівської області на рослинах ярого ріпаку відмічено прояв **переноспорозу**.

Повсюди продовжується заселення та пошкодження ранньої **картоплі колорадським жуком**. Чисельність імаго шкідника становить від 0,5 до 2-5 екз. на рослину, чисельність яйцекладок 0,5-2 екз. на рослину. В південних областях Степу відроджуються личинки, які за чисельності 3-5, макс. 15-20 (присадибні ділянки в Одеській обл.) екз. на кущ пошкодили 2-3% рослин у слабкому і середньому ступені на 25% заселених кущах. На **хрестоцвітних** культурах розвиваються та шкодять **хрестоцвіті блішки, клопи, капустяна муха**. На **цибулі** - **цибулева муха**.

У Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Одеській, Херсонській та інших південних областях на **неорних** землях і **пасовищах** триває відродження личинок **нестадних** (0,5-5 екз. на кв.м) **саранових**. В південних районах Одеської області на багаторічних травах відмічено відродження личинок **італійського пруса**. Ними за середньої чисельності 0,5 екз. на кв.м пошкоджено 1% рослин на 3% обстежених площ. Інтенсивність відродження личинок зростає через підвищення температури повітря.

У Степу та південних областях Лісостепу на **неугіддях, узбіччях доріг та каналів** річок відмічається літ **лучного метелика**, інтенсивністю 1-2 екз. на 10 кроків. Повсюди наявність квітучої рослинності, тепла, помірно волога погода сприятимуть розвиткові та реалізації потенційної плодючості метеликів. В усіх ґрунтово-кліматичних зонах триває літ метеликів **підгризаючих та листогризучих совок**. Відмічено початок яйцекладки на квітучих бур'янах. Наразі для більшості видів совок складаються сприятливі умови для розвитку.


У **садах і виноградниках** живиться комплекс **листогризучих та сисних шкідників**, розвиваються **плодопошкоджуючі фітофаги**. Триває літ метеликів **яблуневої плодожерки** I-го покоління, в південних областях відкладання ними яєць, осередково відродження гусениць (Одеська обл.). На сприйнятливих сортах яблуні продовжується розвиток **борошнистої роси** (1016% дерев, 3-18% листків, 10% розеток). Випадання дощів призвело до проявлення у незахищених насадженнях **парші** (2-5% дерев, 2-10% листків). Повсюди на персику розвивається **кучерявість листків** (2-25% дерев, 4-15, макс. 25% листків), чому сприяло переважання прохолодної дощової погоди. Ураження **моніліозом** (9-30, макс. 65% дерев, 3-15, макс. 30% пагонів) **кісточкових** у поточному році є досить інтенсивним, особливо за умов не проведення захисних заходів. Подекуди **клястоспоріозом, кокомікозом** на кісточкових охоплено від 5 до 60% дерев. На виноградниках дощова погода призвела до проявлення на європейських сортах **мільдю**. У Березівському районі Закарпатської області зафіксовано проявлення на листках **оїдumu**.

В усіх господарствах спеціалістами здійснюється фітосанітарний нагляд за посівами.

За оперативною інформацією про хід робіт із захисту рослин, наданою Головними управліннями Держпродспоживслужби в областях, **17 травня 2019 року** забезпеченість сільгосп підприємств засобами захисту рослин для проведення робіт із захисту посівів сільськогосподарських культур становить понад **31 тис. тонн** препаратів, або **99%** до потреби в I півріччі 2019 року, в тому числі **20,2 тис. тонн** гербіцидів, або **98%** до потреби в них.


**Забезпеченість сільгосп підприємств засобами захисту рослин 17 травня 2019 року**

Тонн



Захист сільськогосподарських культур від шкідників, хвороб і бур'янів проведений на площі близько **17 млн га** (19 млн га - в 2018 р.), в тому числі від бур'янів оброблено – **9 млн га** (10,3 млн га – в 2018 р.). Зменшення порівняно з минулим роком обсягів захисних заходів обумовлене дощовими погодними умовами, через які майже повсюди унеможлиблюється своєчасне та ефективне проведення робіт із захисту рослин.

**Хід робіт із захисту рослин в господарствах України в 2018-2019 роках**



**Озимі та ярі зернові культури захищено від шкідників на площі 2,1 млн га, від хвороб – 3,1 млн га. Також оброблено посіви озимого ріпаку від шкідників на площі понад 1,2 млн га та 0,8 млн га оздоровлено від хвороб.**

Для проведення всього комплексу заходів захисту рослин від шкідливих організмів з початку рок використано близько 15 тис. тонн пестицидів і біопрепаратів. Догляд за посівами сільськогосподарських культур триває.